

OH-Broma VS

Mélange pour prairie extensive et riche en espèces

Prairie fleurie, pour endroit plutôt sec, mélange composé en majorité d'écotype VS. Hauteur : env. 50 à 60 cm, deux fauches par an (env. fin juin et fin septembre).

Choix de l'emplacement

Les endroits pauvres, plutôt secs, ensoleillés avec peu de pression de mauvaises herbes se prêtent bien à cette culture. Choisissez le bon mélange et faites preuve de patience. Vous obtiendrez une prairie riche en espèces !

Semis

La majorité des fleurs sauvages poussent mieux sur un sol bien tassé et grumeleux.

- Griffer au râteau
- Semer en surface
- Compacter avec le dos d'une pelle

Entretien

La présence de mauvaises herbes annuelles au semis n'est pas forcément un inconvénient, elles agissent comme couverture ! Il faut effectuer la coupe de nettoyage au bon moment, dès que le sol est couvert par la végétation. La première année, il peut être nécessaire d'effectuer jusqu'à 3 coupes de nettoyage. Hauteur de coupe : 7 à 9 cm. Evacuer la matière végétale.

Densité de semis

Semer 8 gr/m²



botanica**deutsch****français**

<i>Anthyllis carpatica</i>	Karpaten-Wundklee	Anthyllide des carpates
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	Lotier corniculé
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	Gesse des prés
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	Luzerne lupuline
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette	Esparcette à feuilles de vesce
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	Trèfle des montagnes
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	Trèfle des prés
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	Vesce cracca
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	Bugle rampant
<i>Campanula glomerata</i>	Büschel-Glockenblume	Campanule agglomérée
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	Campanule à feuilles rondes
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	Centaurée jacée
<i>Centaurea scabiosa</i>	Scabiosen-Flockenblume	Centaurée scabieuse
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	Sarriette vulgaire
<i>Crepis biennis</i>	Zweijähriger Pippau	Crépide bisannuelle
<i>Daucus carota</i>	Gewöhnliche Möhre	Carotte sauvage
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	Gaillet jaune
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	Knautie des champs
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauer Löwenzahn	Léontodon hispide
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margerite, Wucherblume	Marguerite
<i>Picris hieracioides</i>	Habichtskrautartiges Bitterkraut	Picride fausse épervière
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	Plantain lancéolé
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	Plantain moyen
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuss	Renoncule bulbeuse
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	Sauge des prés
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	Pimpinelle
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	Silène penché
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnliches Leimkraut	Silène commune
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Feld-Thymian	Thym serpolet
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart	Salsifis douteux
<i>Tragopogon orientalis</i>	Östlicher Bocksbart	Salsifis oriental
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Duftendes Ruchgras	Flouve odorante
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental Glatthafer	Fenasse
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	Brize intermédiaire
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	Brome dressé
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	Fétuque des prés
<i>Festuca rubra rubra</i>	Ausläufer-Rotschwingel	Fétuque rouge traçante
<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaumhafer	Avoine pubescente
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	Pâturin des prés
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer	Avoine dorée